

Différencier les Sars

Pourquoi ? :

Pour savoir les reconnaître car la réglementation pour les mailles le nécessite : Certaines espèces sont maillées en méditerranées et pas en atlantique.

Actuellement les mailles sont :

- Atlantique :
 - SAR COMMUN Diplodus sargus 25 cm
- Méditerranée :
 - SAR COMMUN Diplodus sargus 23 cm
 - SAR à museau pointu Diplodus puntazzo 18 cm
 - SAR à tête noire Diplodus Vulgaris 18 cm
 - SPARAILLON Diplodus annularis : 12 cm

Sachant que par ailleurs il existe au moins une bonne dizaine de sous espèces, d'appellations différentes ou de particularités régionales ce qui suit ne présentera que les 4 espèces ci-dessus plus le sar tambour (Diplodus cervinus) qui est assez courant.

Malgré une bonne connaissance de ces espèces, il sera parfois difficile de différencier quelques heures après la sortie de l'eau un sar commun d'un sar à museau pointu, ou en méditerranée un sparailon (le pataclet) parce que certaines caractéristique disparaissent assez vite (couleur des nageoires, rayures sombres)

Conclusion :

1. Aucune difficulté à différencier "Verade" et Sar commun
2. Possibilité de confusion entre Sar commun et Sar à museau pointu
3. Possibilité de confusion entre Sparailon et autres sars (pas très important au pays Basque : le Sparailon est rare)

Nous avons retenu au niveau du comité Régional depuis maintenant plusieurs années de retenir pour les sparidés une maille unique de 25 cm. D'abord parce que c'est le seul moyen simple de ne pas faire d'erreur sur les mailles mais aussi d'agir pour la protection de ces espèces en permettant aux individus matures de se reproduire au moins une fois.

Récemment et notamment lors du championnat de France nous n'avions pas pris la précaution de préciser cela et les pêcheurs de PACA n'ont pas manqué d'exiger que les "vérades " (sars à tête noire) ne soient pas maillées. Contraint d'accepter je ne suis pas sûr que tous les sars passés pour des vérades fussent des sars à tête noire.

Après avoir lu ce document vous serez plus à même de faire la différence, les espèces méditerranéennes sont présentes au sud du golfe de Gascogne et quand vous irez pêcher ailleurs chez nos amis méditerranéens vous serez plus vigilants (qui n'a jamais douté de certains "pataclets" présentés à la pesée alors qu'il s'agissait de petits sars communs ?).

Pour accéder à la fiches de description détaillée cliquer sur le lien, si cela ne fonctionne pas copier l'adresse dans votre navigateur Internet .

SAR COMMUN : *Diplodus Sargus*

Voir description complète : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=463



Critères de reconnaissance

Opercules généralement bordés de noir
Tache du pédoncule caudal en forme de selle

8 à 9 stries verticales sombres sur le dos pour les individus de moins de 15 cm

Nageoires pelviennes sombres avec le bord antérieur blanc

Caudale bordée de noir à son extrémité arrière

SAR à museau Pointu : *Diplodus Puntazzo*

Voir description complète : http://doris.fessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=477



Critères de reconnaissance

Museau pointu

Tache annulaire au pédoncule caudal

Une dizaine de bandes verticales plus ou moins sombres

Tache sombre à la base des nageoires pectorales

Caudale bordée de noir à son extrémité arrière

SAR à Tête Noire : *Diplodus Vulgaris*

Verade ou Veirade en Méditerranée

Voir description complète : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=161



Critères de reconnaissance

Corps ovale et comprimé latéralement de coloration argentée

Possède 2 barres noires : l'une sur la nuque, l'autre à la base de la nageoire caudale

Rayures jaunes horizontales sur le corps

SAR tambour : *Diplodus Cervinus*

Appelé aussi Sar à Grosse lèvres

Voir description complète : http://doris.ffesfm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=471**Critères de reconnaissance**

5 larges bandes verticales plus ou moins sombres sur le dos *
Lèvres épaisses

* *Souvent marrons sur la côte Basque*

SPARAILLON: *Diplodus annularis*

Pataclet à Marseille

Voir description complète : http://doris.ffesfm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=487**Critères de reconnaissance**

Nageoires pelviennes et le début de la nageoire anale de couleur jaune
Tache sombre en forme d'anneau presque complet sur le pédoncule caudal *
Coloration générale gris argenté, avec des reflets jaunes

* *L'anneau caudal est beaucoup plus prononcé chez le Pataclet que chez le sar commun où il est en forme de selle et non fermé côté nageoire pelvienne*

Autre information concernant particulièrement les Sars**L'ANILOCRE : *Anilocra physoïde***

Aussi appelé Poux de mer, c'est un parasite de plusieurs espèces (sars, vieille, etc.). Décrit comme étant en général fixé sur le corps, la queue, la tête, je n'en ai trouvé que dans la gueule des sars fixés sur les branchies (ils se nourrissent du sang). Les sars parasités sont souvent amaigris, on trouve parfois deux anilocres de taille différente (le plus gros est la femelle)



L'anilocre peut atteindre 4cm, on en trouve assez souvent atteignant 2 cm dans des sars de 25 cm, obstruant presque entièrement la gueule